



ЗСШ		ярус		РЕГІОНУС	СЕРІЯ	СВІТА	ПІДСВІТА	БІОСТРАТИГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНОЇ ОКРАЇНИ ДОНБАСУ (за О.Д. Веклич, тут)																
Масштахтський	Верхній	ХАРАКТЕРНІ ВИДИ ФОРАМІНІФЕР ЯРУСІВ І ПІД'ЯРУСІВ за В.Ф. Горбенком і О.С.Липник [Атлас..., 1974; Стратиграфія..., 1971, Бланк, Горбенко, 1963, 1965, 1968, Бланк, Липник, 1963, 1964]						ХАРАКТЕРНІ ВИДИ ФОРАМІНІФЕР за В.Ф. Горбенком і О.С.Липник [Атлас..., 1974; Стратиграфія..., 1971, Бланк, Горбенко, 1963, 1965, 1968; Бланк, Липник, 1963, 1964.]		ЗОНИ ЗА БЕНТОСНИМИ ФОРАМІНІФЕРАМИ (О.Д. Веклич, 2018, 2020, Стратиграфія..., 2013, тут)		ХАРАКТЕРНІ ВИДИ ФОРАМІНІФЕРОВИХ ЗОН (О.Д. Веклич, 2018, 2020, Стратиграфія..., 2013, тут)												
		Північний Донбас						Північний Донбас		Північна країна Донбасу														
Кампанський	Верхній	<i>Anomalina (Hanzawaia) ekblomi</i> (Brotz.), <i>Pseudovigerina plummer</i> Cushman., <i>Grammastomum (Bolivina) decurrens</i> (Ehr.), <i>Reussella (Cuneata) minutus</i> (Marss.), <i>R. (C.) maastrichtica</i> Lipn.,		Б	Е	Р	С	И	Н	С	Б	Ь	К											
		<i>Anomalina</i> aff. <i>grandis</i> Vass., <i>Eponides praejacksonensis</i> Lipn., представники родів <i>Globulina</i> , <i>Pirulina</i> , <i>Guttulina</i> та ін.																						
		<i>Anomalina (Hanzawaia) ekblomi</i> (Brotz.), <i>A. (Brotzenella) praecuta</i> Vass., <i>Pseudovigerina plummer</i> Cushman., <i>Bullimina imbricata</i> Reuss																						
	Нижній																							
	Верхній	<i>Eponides franke</i> Brotz., <i>Anomalina (Brotzenella) taylorensis</i> (Cars.), <i>Stensioeina (Angulogavelinella) stellaria</i> Vass., <i>Neoflabellina reticulata</i> Reuss, <i>Globorotalites emdyensis</i> Vass., <i>B. incrassata</i> Reuss																						
	Середній	<i>Cibicides spiropunctatus</i> Gall. et Morr., <i>Cibicides (Cibicoides) voltzianus</i> (Orb.)																						
Сantonський	В.	<i>Voloshinovella aequigranensis</i> (Beiss.), <i>Orbignyna inflata</i> (Reuss), <i>O. simplex</i> (Reuss), <i>Gavelinella stelligera</i> (Marie), <i>G. santonica</i> Ak.																						
	Н.	<i>Bolivinopsis rosula</i> (Ehr.), <i>Heterostomella cuneata</i> Sand., <i>Arenobulimina senonica</i> Mjatl., <i>Cibicides beaumontianus</i> (Orb.), <i>C. excavatus</i> Brotz., <i>Stensioeina exculpta</i> (Reuss), <i>Bulimina ventricosa</i> Brotz., <i>Neoflabellina rugosa</i> (Orb.), <i>Gavelinella infrasantonica</i> (Balakhm.), <i>G. thalmanni</i> (Brotz.)																						
	С.	<i>Anomalina (Gavelinella) infrasantonica</i> Balakhm., <i>A. (G.) thalmanni</i> (Kell.), <i>Cibicoides eriksdalensis</i> (Brotz.), <i>Bolivinina eleyi</i> (Cushman.), <i>Spiroplectammina embaensis</i> Mjatl.																						
	Н.	<i>Eponides biconvexus</i> Marie, <i>Parrella (Osangularia) cordieriana</i> (Orb.), <i>Anomalina (Gavelinella) costulata</i> (Marie), <i>Ataxophragmium nautiloides</i> Brotz.																						
Турунський	В.	<i>Euvigerina regularis</i> (Kell.), <i>Bolivinopsis praelonga</i> (Reuss), <i>Anomalina (Gavelinella) moniliformis</i> (Reuss), <i>Stensioeina praeexculpta</i> (Kell.)																						
	С.	<i>Anomalina (Gavelinella) nana</i> Ak., <i>Anomalina (Brotzenella) berthelini</i> (Kell.), <i>Gavelinella ammonoides</i> Reuss, <i>Reussella turonica</i> Ak., <i>Gaudryina serrata</i> Franke, <i>Bolivinina simplex</i> Vass., <i>Eponides turonicus</i> Lipn.																						
	Н.	<i>Anomalina (Gavelinella) nana</i> Ak., <i>A. kelleri</i> Mjatl., <i>A. vesca vesca</i> (N. Byk.), <i>Bolivinina simplex</i> Vass.																						
	В.	<i>Tritaxia cenomana</i> Gorb., <i>Gaudryina serrata</i> Franke, <i>Anomalina (Gavelinella) cenomanica cenomanica</i> (Brotz.), <i>Pseudospiroplectinata plana</i> Gorb.																						
Сенюанський																								
Нижній	<i>Tritaxia cenomana</i> Gorb., <i>Cibicides (Cibicoides) gorbekoi</i> (Ak.), <i>Cibicides jarzevae</i> Vass. (=Lingulogavelinella formosa (Brotz.)), <i>Rotalipora (Thalmaninella) appenica</i> (Renz), <i>R. reicheli</i> Morn., <i>Guembelitra cenomana</i> (Kell.), <i>Rotundina (Praeglobotruncana) stephani</i> (Gand.).																							
Верхній	<i>Gyroidinoides nitidus</i> (Reuss), <i>Anomalina (Brotzenella) berthelini</i> (Kell.), <i>Anomalina (Gavelinella) cenomanica cenomanica</i> (Brotz.), <i>Anomalina (?) (Lingulogavelinella) globosa</i> (Brotz.), <i>Globigerina (Hedbergella) infracretacea</i> (Glaessn.), <i>G. (H.) cretacea</i> Orb.																							
С.																								
														ПІДСТЕЛЯЮЧІ ВІДКЛАДИ										

Рис. 4.1. Схема порівняння характерних комплексів форамініфер Північної країни Донбасу за В.Ф. Горбенком [Бланк и др., 1965,1966, 1968; Стратиграфія..., 1971; Атлас..., 1974; Найдин и др., 1980] і О.С. Липник [Липник, 1961; Бланк, Липник, 1962, 1964; Стратиграфія..., 1971; Найдин и др., 1980; Липник и др., 1981а, б; Иванников и др., 1987, 1991; Стратиграфические..., 1993] та зональний поділ (бентосні форамініфери) за О.Д. Веклич (тут) [Веклич, 2018, 2020, Стратиграфія..., 2013]

